

殺菌剤
アフェットフロアブル
ペンチオピラド水和剤

平成24年6月13日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 「ぶどう」の適用病害虫名に「さび病」を追加。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチピラドを含む農薬の総使用回数				
キャベツ	菌核病、株腐病	2000倍	100～300 L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内				
きゅうり	灰色かび病、 菌核病、うどんこ病										
メロン	つる枯病										
トマト ミニトマト	うどんこ病	2000～ 4000倍									
	灰色かび病 菌核病、葉かび病	2000倍									
ピーマン	灰色かび病、黒枯病	2000～ 4000倍									
	うどんこ病										
なす	灰色かび病、菌核病、 うどんこ病、すすかび病	2000倍						200～700 L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	3回以内
いちご	灰色かび病、うどんこ病										
たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病										
レタス	灰色かび病、菌核病、すそ枯病										
おうとう	灰星病、幼果菌核病										
なし	黒星病、赤星病、うどんこ病										
ぶどう	灰色かび病、晩腐病、黒とう病、 褐斑病、うどんこ病、 さび病										
もも	灰星病、黒星病										
りんご	黒星病、赤星病、うどんこ病、 斑点落葉病、褐斑病、モリ病、 黒点病、すす点病、すす斑病										
花き類・観葉植物	灰色かび病		100～300 L /10a	発病初期							

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。