

殺虫剤

アルバリン顆粒水溶剤

ジノテフラン水溶剤

平成24年7月11日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 「ねぎ」の適用病害虫名に「タネバエ」を使用法「灌注」で追加する。
- 作物名に「食用金魚草」を追加する。
- 「食用パンジー」の使用時期を「収穫3日前まで」に変更する。
- 作物名「ズッキーニ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ねぎ	-	タネバエ	50倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5~4.0L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
食用金魚草			3000倍		<u>収穫3日前まで</u>			2回以内
食用パンジー								
ズッキーニ		アブラムシ類	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	<u>3回以内</u> (<u>定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内</u>)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

アグロ カネショウ株式会社