

殺虫剤

アルバリン粒剤

ジノテフラン粒剤

平成26年8月27日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- ズッキーニの適用病害虫名「アブラムシ類」に使用時期「生育期 但し、収穫14日前まで」、使用方法「株元散布」を使用量「1g/株」で追加し、ジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 作物名に「セルリー」を追加する。
- 「だいこん」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)」に変更する。
- 「ふき」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。

**太字**が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ズッキーニ	コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	<u>4回以内</u> (定植時の土壌混和は1回以内、 定植後の株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	<b>生育期 但し、 収穫14日前まで</b>		株元散布	
セルリー		2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時		播溝土壌混和	<u>5回以内</u> (は種時の播溝土壌混和は1回以内、 は種時の全面土壌混和は1回以内、 粒剤の散布は1回以内、水溶剤 及び液剤の散布は合計2回以内)
	キスジノミハムシ	4~6kg/10a			全面土壌混和	
		9~12kg/10a			散布	
ふき	アブラムシ類	6kg/10a	生育期 但し、 収穫30日前まで	土壌表面散布	<u>3回以内</u> (土壌表面散布は1回以内、 散布は2回以内)	
		20kg/10a	定植後~生育期 (草丈20cm頃まで)但し、 収穫45日前まで			