

**適用拡大情報**

農林水産省登録  
第14359号

**殺菌剤**  
**キノンドー水和剤80**  
有機銅水和剤

平成26年11月17日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

●作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期「収穫60日前まで」を「収穫30日前まで」へ変更。

下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む 農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病	1200~2000倍	200~700L/10a	収穫3日前まで	9回以内	散布	12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)
	輪紋病	1200倍					7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)
りんご	黒星病、斑点落葉病	1200~1600倍		収穫14日前まで	4回以内		4回以内
	輪紋病、褐斑病、 炭疽病、すす斑病、 すす点病、黒点病	1200倍					8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)
マルメロ かりん	黒点病	1200~2000倍		収穫30日前まで	5回以内		5回以内
	ごま色斑点病	1200倍					3回以内
かき	炭疽病、うどんこ病	1000~1400倍		収穫45日前まで	4回以内 (開花後は1回)		4回以内 (開花後は1回以内)
	落葉病	1000倍					5回以内
みかん	黒点病	800~1000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	灰色かび病	800倍					5回以内
かんきつ (みかん を除く)	黒点病	800~1000倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	5回以内	5回以内	
	灰色かび病、幹腐病	800倍				5回以内	
ぶどう	黒とう病	1200~1600倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	5回以内	5回以内	
	べと病	1200倍				5回以内	
はくさい	軟腐病	1200倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	5回以内	5回以内	
レタス	腐敗病	1200~1600倍	100~300L/10a	収穫21日前まで	5回以内	5回以内	
食用ゆり	鱗茎さび症	50倍	—	植付前	1回	球根瞬間浸漬	1回
麦類 (小麦を除く)	雪腐病	400~800倍	100~200L/10a	根雪前	2回以内	散布	2回以内
小麦				眼紋病	400倍		60~150L/10a
	芝	雪腐病	200~400倍	0.5~1L/m <sup>2</sup>	根雪前		3回以内
80~100倍			0.2~0.25L/m <sup>2</sup>				
西洋芝 (ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	40倍	0.1L/m <sup>2</sup>	発病初期	4回以内	葉柄基部散布	4回以内
シクラメン	葉腐細菌病	10倍	2~5ml/株	発病初期	4回以内	葉柄基部散布	4回以内