

適用拡大情報

農林水産省登録
第18064号

殺菌剤
キンセット水和剤80
銅・有機銅水和剤

平成26年11月17日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期「収穫60日前まで」を「収穫30日前まで」へ変更。
- 作物名「だいこん」の使用時期「収穫30日前まで」を「収穫21日前まで」へ変更。

下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	銅を含む 農薬の総 使用回数	有機銅を 含む農薬の 総使用回数		
みかん	かいよう病 そうか病	1000~1600倍	200~ 700L/10a	収穫30日前まで	5回以内	散布	-	5回以内		
かんきつ (みかんを除く)				<u>収穫30日前まで</u>	3回以内			3回以内		
りんご	斑点落葉病 輪紋病 褐斑病 炭疽病	1000~1200倍		収穫14日前まで	4回以内			7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)		
なし	輪紋病 黒星病	1000倍		収穫3日前まで	9回以内			12回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)		
おうとう	せん孔病			収穫終了後~ 落葉期まで	3回以内			6回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内)		
もも	せん孔細菌病 縮葉病			収穫後~開花直 前まで 但し、 収穫60日前まで	5回以内			8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)		
ネクタリン	せん孔細菌病			収穫後~ 開花直前まで	5回以内			5回以内		
麦類 (小麦を除く)	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	400倍		100~ 200L/10a	根雪前			2回以内	2回以内	
小麦	紅色雪腐病	乾燥種子 重量の0.5%		-	は種前			1回	種子粉衣 (乾粉衣)	5回以内 (種子への処理は 1回以内)
	紅色雪腐病 条斑病	乾燥種子 重量の1%		-	は種前			1回	種子粉衣 (湿粉衣)	
	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	400倍	100~ 200L/10a	根雪前	5回以内	散布				
	眼紋病	400~800倍	60~150L/10a	収穫60日前まで						
レタス	軟腐病	1000~1500倍	100~ 300L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	5回以内			
ばれいしょ		1000~1400倍		収穫14日前まで						
たまねぎ				<u>収穫21日前まで</u>						
だいこん				収穫7日前まで	5回以内					
にんにく				1000倍	1000倍			1000倍	1000倍	1000倍