

殺虫剤
サムコルフロアブル10
クロラントラニプロール水和剤

平成 29 年 7 月 26 日付けで以下の通り適用拡大されました

- ・作物名「おうとう」及び「うめ」に適用病害虫名「コスカシバ」を希釈倍数「5000倍」にて追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	
りんご	シクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 キンモンホガ ギンモンホグリガ ヒメボクトウ	2500～5000倍	200～ 700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	ヨモギエダシヤク	5000倍						
なし	ケムシ類 シクイムシ類	2500～5000倍						
	ハマキムシ類 ヒメボクトウ	5000倍						
かき	ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロヘリアオイラガ カキノハタムシガ ハスモンヨトウ フタモンタテラメイガ							
	ぶどう							ハマキムシ類 ケムシ類 モンキクロノメイガ クビアカスカシバ
おうとう	コスカシバ	2500～5000倍						
	ハマキムシ類 ケムシ類							
	オトウシヨウジヨウ バエ							2500倍
うめ	ノメトカギリキリガ コスカシバ	5000倍						収穫14日前 まで
	ケムシ類	2500～5000倍						
	ハマキムシ類	2500倍						
すもも	シクイムシ類	2500～5000倍	収穫3日前 まで					
あんず	ケムシ類 ハマキムシ類			2500倍				
もも	シクイムシ類 ハマキムシ類	5000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内			
初刈り	モモホグリガ		収穫3日前まで					
さとうきび	イネヨトウ	2000倍 2000～4000倍 4000倍	100～ 300L/10a	収穫30日前 まで	3回以内	4回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は3回以内)		
茶	チャノコカケモンハマキ チャハマキ ヨモギエダシヤク		2000倍	200～ 400L/10a	摘採3日前 まで	1回	1回	
	チャノホリガ		2000～4000倍					
	ハスモンヨトウ		4000倍					

