



適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	タゾメットを 含む農業の 総使用回数
非結球メキャベツ	萎黄病、一年生雑草		定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
キャベツ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病、萎黄病	20~30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
	パーティシリウム萎凋病 根こぶ病、ネコブセンチュウ 一年生雑草					
はくさい	根こぶ病、尻腐病、根くびれ病 黄化病、ネコブセンチュウ 一年生雑草					
だいこん	ネグサレセンチュウ	10~20kg/10a	は種21日前まで			
かぶ	パーティシリウム黒点病 根こぶ病、萎黄病、一年生雑草	20~30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
こまつな しるな	萎黄病、根こぶ病、一年生雑草		は種10日前まで は種21日前まで			
ブロッコリー カリフラワー	テンサイシストセンチュウ	30kg/10a 20~30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
つぼみな チンゲンサイ	根こぶ病 一年生雑草	20kg/10a				
ひろしまな			30kg/10a			
みぶな みずな	立枯病(ピシウム菌) 根こぶ病、一年生雑草		は種12日前まで			
はつかだいこん	一年生雑草	20kg/10a	は種35日前まで			
きゅうり	苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌)	200~400g/m ³				
	つる割病、半身萎凋病 白絹病、一年生雑草					
かぼちゃ	苗立枯病(リゾクトニア菌) フザリウム立枯病、一年生雑草	20~30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布 して土壌と混和する。	
メロン	黒点根腐病、つる割病 半身萎凋病、黒変根腐症 白絹病、一年生雑草	30kg/10a				
	紅色根腐病					
すいか	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200~400g/m ³			土壌に本剤の所定量を加え 十分混和する。	
にがうり	つる割病、白絹病、一年生雑草	20~30kg/10a	は種又は定植 21日前まで		本剤の所定量を均一に散布 して土壌と混和する。	
	つる割病、一年生雑草 ネコブセンチュウ					
トミマト ミニトマト	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200~300g/m ³			土壌に本剤の所定量を加え 十分混和する。	
	萎凋病、褐色根腐病、白絹病 根腐萎凋病、半身萎凋病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	20~30kg/10a				
	紅色根腐病	30kg/10a				
	青枯病	30~60kg/10a 30kg/10a				
なす	苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病、ネコブセンチュウ 白絹病、一年生雑草	20~30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布 して土壌と混和する。	
ピーマン	苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病、萎凋病、青枯病 白絹病、一年生雑草	30kg/10a				
ばれいしょ	そうか病、粉状そうか病 黒あざ病、萎凋病、一年生雑草	20~30kg/10a	植付21日前まで			
とうがらし類	苗立枯病(リゾクトニア菌) 萎凋病、疫病、青枯病 一年生雑草	30kg/10a	定植21日前まで			





適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	タゾメットを 含む農業の 総使用回数
ねぎ	黒腐菌核病	30～60kg/10a	は種又は定植 14日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布 して土壌と混和する。	1回
	紅色根腐病 ネギハモグリバエ	30kg/10a				
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 白絹病、小菌核腐敗病 萎凋病、根腐萎凋病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a				
わけぎ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草		は種又は定植 21日前まで			
たまねぎ	黒腐菌核病	30～60kg/10a				
	紅色根腐病	30kg/10a				
	乾腐病、白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
	苗立枯病	20～40kg/10a				
	黒穂病、一年生雑草	20～30kg/10a	秋期(翌春は種)			
葉たまねぎ(苗床)	一年生雑草	10～20kg/10a	は種14日前まで			
にんにく	イモグサレセンチュウ、白絹病 紅色根腐病、一年生雑草		植付28日前まで		本剤の所定量を均一に散布 して土壌と混和する。	1回
らっきょう	根腐病、乾腐病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	30kg/10a	植付21日前まで			
にら	乾腐病、紅色根腐病 白絹病、一年生雑草		は種又は定植 21日前まで			
にんじん	萎凋病、根腐病、しみ腐病 乾腐病、ネコブセンチュウ 白絹病、一年生雑草	20～30kg/10a				
パセリ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 疫病、萎凋病、一年生雑草	30kg/10a				
セルリー	萎黄病、一年生雑草					
あしたば	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草		は種10日前まで			
しゅんぎく	萎凋病、一年生雑草	20kg/10a	は種21日前まで			
ごぼう	萎凋病、黒あざ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種28日前まで			
もりあざみ	黒あざ病、半身萎凋病、一年生雑草	30kg/10a	は種21日前まで			
レタス	すそ枯病、白絹病、一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植 14日前まで			
	ネグサレセンチュウ	30kg/10a				
非結球レタス	すそ枯病、根腐病、白絹病 一年生雑草		は種又は定植 21日前まで			
食用ぎく	センチュウ類 (ハガレセンチュウを除く) 萎凋病、半身萎凋病 白絹病、一年生雑草	20～30kg/10a				
	青枯病	30kg/10a				
ふき	半身萎凋病、白絹病、一年生雑草		は種又は定植 21日前まで			
みつば	立枯病、一年生雑草	20kg/10a				
豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	苗立枯病(リゾクトニア菌) 莖腐病、一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
さやいんげん	苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病、白絹病、一年生雑草	20～30kg/10a				
えだまめ	ダイズシストセンチュウ	30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
さやえんどう 実えんどう	苗立枯病(リゾクトニア菌) 莖腐病、一年生雑草	20～30kg/10a				
未成熟そらまめ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 莖腐病、えそモザイク病 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前又は 定植45日前まで			





適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ダゾメットを 含む農業の 総使用回数
かんしょ	紫紋羽病、つる割病、白絹病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	20~30kg/10a	植付21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
こんにゃく	根腐病、白絹病 乾腐病、一年生雑草					
さといも さといも(葉柄)	乾腐病、ネグサレセンチュウ 一年生雑草					
しょうが	根茎腐敗病 一年生雑草	30~60kg/10a	定植21日前まで			
葉しょうが	根茎腐敗病 一年生雑草	20~30kg/10a				
みょうが(花穂) みょうが(莖葉)	立枯症、一年生雑草	30kg/10a	定植42日前まで			
いちご	萎黄病、萎凋病、炭疽病 芽枯病、一年生雑草	20~30kg/10a	仮植又は定植 21日前まで			
	青枯病、疫病	30kg/10a				
ほうれんそう	ハウレンソウケナガコナダニ 立枯病、萎凋病、株腐病 根腐病、一年生雑草	20~30kg/10a	は種10日前まで			
てんさい	叢根病、苗立枯病	200~400g/m ³	秋期(翌春は種)			
やまのいも	根腐病、褐色腐敗病 一年生雑草	20~30kg/10a	植付21日前まで			
つるむらさき	ネコブセンチュウ、一年生雑草	30kg/10a	定植21日前まで			
しそ	青枯病、一年生雑草		は種14日前又は 定植21日前まで			
モロヘイヤ チャービル	ネコブセンチュウ、一年生雑草 一年生雑草	20kg/10a	定植30日前まで は種42日前まで			
なぶどう りんご	白紋羽病 紫紋羽病、白紋羽病	100g/m ² 50~100g/m ²	夏期~秋期			
花き類・ 観葉植物	苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病、球根腐敗病 首腐病、半身萎凋病 萎凋病、萎黄病、白絹病 立枯病、根頭がんしゅ病 ネコブセンチュウ	20~30kg/10a	は種又は植付前			
	一年生雑草	20~60kg/10a				
	青枯病	30kg/10a				
カーネーション	萎凋細菌病	20~30kg/10a	植付前			
きく	センチュウ類 (ハガレセンチュウを除く)					
ストック	苗腐病 萎凋病	30~40kg/10a	植付前			
ぼたん しゃくやく	根黒斑病					
スターチス	萎凋細菌病	20~30kg/10a	は種又は植付前			
グロリオサ	紅色根腐病					
スイトピー	腰折病					
さくらそう	軟腐病					
トルコギキョウ	根腐病					
パンジー						
アイスランドポピー	萎縮病					
せんりょう	立枯病、一年生雑草					
つつじ類	センチュウ類、一年生雑草					
たばこ	角斑病、野火病、センチュウ類			10~20kg/10a	秋期(翌春植付)	
	立枯病、黒根病、疫病 一年生雑草	20~30kg/10a				
	疫病、センチュウ類	5~10kg/10a	春期(植付前)			





適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	タゾメットを 含む農業の 総使用回数
芝	一年生雑草	目土用土 1m ³ 当り 100~200g	雑草発生前	1回	土壌に本剤の所定量を加え 十分混和する。	1回
		30kg/10a	は種又は定植 21日前まで		本剤の所定量を均一に散布 して土壌と混和する。	
樹木類(苗木)		20~30kg/10a	植付前			
桑	紫紋羽病、白紋羽病	1株当り(4m ²) 400~600g	夏期~秋期		被害株跡地に本剤の所定量 を均一に散布して土壌と十分 混和する。	





⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 本剤を処理する前に耕起整地する。
- 本剤は土壌中の水分によって分解し、ガスを発生することによって効果を発揮するもので、土壌の種類、水分含量、温度等により効果にふれがあるので、以下のことに十分留意する。
 - ① 地温が10℃以下のときには使用しない。
 - ② 砂質土壌や乾燥した土壌で使用する場合は、ていねいに混和した後灌水して適度の水分を与えてから被覆する。
 - ③ 次の場合はガスの拡散が遅いので被覆期間を適宜延長する。
 - ア. 重粘土質の土壌の場合
 - イ. 降雨などにより土壌水分が多い場合
 - ウ. 地温が低い (15℃以下) 場合
- センチュウが多発する条件、或いはトマト、なすではセンチュウ類に対する効果が劣る場合があるので、センチュウを防除対象とする場合には、他の防除方法と併用して使用する。
- ガス抜きが不十分であると薬害が生じるおそれがあるので、少なくとも2回は耕起によるガス抜きを実施する。なお、ガス拡散の遅い条件の場合は特にていねいに行う。
- 本剤を全面に処理する場合、深さ15～25cmに土壌と十分に混和する。特に、やまのいもに使用する場合、深さ50～60cmに土壌と十分に混和する。混和後ビニール等で被覆または鎮圧散水してガスの蒸散を防ぐ。7～14日後被覆を除去して、ガス抜きを行う。
- 本剤を苗立枯病または芝の目土用土に処理する場合、本剤を十分混和後ビニール等で被覆し、7～14日後被覆を除去して、ガス抜きを行う。
- 本剤が作物に直接ふれると薬害を生じるので、周辺に作物がある場合にはかからないように十分間隔をおいて薬剤を処理する。
- **温室やビニールハウスなどの施設内に作物がある場合、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。**
- りんご、桑、なし及びぶどうに使用する場合は、被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本剤を散布し、深さ25～40cm (りんごの場合は深さ40cm) に土壌と均一に混和する。本剤処理20日後に被覆を除去して耕起し、翌春に植え付ける。また、りんご、なし及びぶどうでは、植え付けた年は果実を収穫しない。
- ごぼうに使用する場合は生育抑制・岐根等の薬害を生じるおそれがあるので、処理からは種までの期間を十分とり、ガス抜きをていねいに行い、発芽テスト等で安全を確認の上、は種する。
- しょうが及び葉しょうがの根茎腐敗病に対しては、多発生条件では効果が不十分な場合があるので注意する。
- は種又は定植の20～10日前に使用する場合は、地温20℃以上の条件に限って使用する。
- 芝の目土に処理する場合は、目土中に含まれる雑草種子を殺す目的で目土を処理するものであるので除草剤として、芝生に直接散布する事のないように注意する。
- 葉たまねぎ (苗床) 及びたまねぎのは種14日前までに使用する場合は、本剤を均一に散布後、レーキ等で浅く (2～3cm) 混和し、ビニール等で被覆する。7日後に被覆を除去し、さらにその後7日間放置し、は種前にレーキ等で浅く整地によるガス抜きを行う。
- たまねぎに秋期に使用する場合は、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆する。約20日後に被覆を除去してガス抜きを行う。は種は翌春に行う。
- てんさいに秋期に使用する場合は、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆する。約20日後に被覆を除去してガス抜きを行う。は種は翌春に行う。
- たばこに使用する場合は、次のことに注意する。
 - ① 秋期に使用する場合は、本剤を均一に散布後、十分混和する。混和後鎮圧してガスの蒸散を防ぎ翌春耕起した後、植え付ける。
 - ② 春期使用する場合は、本剤を散布後、十分混和する。混和後そのまま放置し、2週間後に畦立てをし、その2日後にビニール等で被覆する。さらに2週間後に植え付ける。





効果・薬害等の注意(つづき)

- ミツバチの巣箱周辺での使用はさける。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物** 取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。皮膚に付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 本剤の処理の際は吸収缶付き(活性炭入り)防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴などを着用する。ガス抜き作業の際及びガス抜き作業前に施設内に立ち入る場合にも同様の防護マスクを着用する。また、薬剤が皮膚に付着したり、粉末や発生するガスを吸い込んだりしないよう注意し、作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 作業に際してはガスに暴露しないよう風向き等を十分配慮する。
- 作業中及びくん蒸中の圃場等へ小児等作業に関係ないものや、家畜、家禽が立ち入らないよう十分注意する。
- 住宅付近での使用に当っては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮し、特に住宅に隣接する圃場では使用しない。
- 水にふれると有毒なガスが発生するので保管及び取扱いに注意する。

治療法…該当なし

魚毒性等…水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。カギをかける。種子、苗、肥料及び他の農薬などと隔離する。盗難・紛失の際は、警察に届け出る。

PRTR法

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。
- 空袋・空ボトルは圃場などに放置せず適切に処理する。

欄外

- 施設内で使用する場合、十分換気をして作業を行う。本剤は地温が高いほどガスの拡散が速いので、作業はできるだけ早朝など地温の低い時に行い、散布後速やかに土壌混和し被覆する。大型の連棟ハウスでは、散布から土壌混和、被覆までの一貫作業を小面積ごとに順次行うようにする。
- 本剤をクロルピクリン剤と同時処理する場合は、ガスの抜けが遅く薬害を生じるおそれがあるので、ガス抜きからは種または定植までの期間を適宜延長し、発芽試験で安全を確認の上、は種または定植を行う。

