

殺虫剤
兼商デミリン水和剤
ジフルベンズロン水和剤

平成30年3月28日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「ねぎ」の適用病害虫名に「クロバネキノコバエ類」を追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフルベンズロンを含む農薬の総使用回数
りんご	キンモンホソガ シンクイムシ類	2000～4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫30日 前まで	3回以内	散布	3回以内
	ギンモンハモグリガ	3000～6000倍					
	ケムシ類	4000倍					
なし	シンクイムシ類 ナシチビガ	2000～4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
かき	カキノヘタムシガ	2000～3000倍					
かんきつ	ミカンハモグリガ						
	チャノキイロアザミウマ	2000倍		収穫前日 まで	2回以内		2回以内
もも	モモハモグリガ シンクイムシ類	2000～3000倍					
メロン	ミナミキイロアザミウマ	1500～3000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
すいか		1000～2000倍					
きゅうり		1000倍					
ねぎ	タマネギバエ	2000倍	150～ 300ml /㎡	収穫21日 前まで	3回以内	株元灌注	3回以内
	クロバネキノコバエ類		300ml /㎡				
しょうが	アワノメイガ	1000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで		散布	
マッシュルーム	キノコバエ類	375倍	1.5ℓ /㎡	覆土時 但し 収穫21日前 まで	1回	覆土 表面散布	1回
茶	チャノホソガ	2000～4000倍	200～ 400ℓ /10a	摘採21日 前まで		散布	3回以内
	ヨモギエダシャク	2000倍					
樹木類	ケムシ類 (若～中齢幼虫)	4000～8000倍	200～ 700ℓ /10a	—	3回以内	散布	3回以内
からまつ	カラマツマダラメイガ (若～中齢幼虫)	4000～6000倍					
まつ類	ハバチ類 (若～中齢幼虫)	100倍					
	マツカレハ若齢幼虫	200倍	6ℓ /10a				

<使用上の注意事項の削除>

- ねぎのタマネギバエ防除に使用する場合、株元の土壤に本剤の2000倍液を1㎡当り150～300ml散布すること。