

除草剤

カノン粒剤6.7

DBN 粒剤

平成30年8月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」の使用方法「散布」を「全面土壌散布」に変更。
- 作物名「桑」の使用方法「散布」を「全面土壌散布」に変更。

【変更後】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	DBNを含む農薬の総使用回数
りんご	—	一年生雑草	春期の雑草発生始期	全土壌	8～12 kg/10a	1回	<u>全面土壌散布</u>	1回
		一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) スギナ	秋冬期の雑草発生前～発生始期		5～6 kg/10a			
なしもも		ギンギシ、ヨモギ、タンポポ、ヤブガラシ等の多年生広葉雑草	春期の雑草発生始期～生育期		8～10 kg/10a		雑草の株元又は成長点に所要量を局所処理する。	
		桑	一年生雑草	雑草発生前～発生始期(春又は夏切直後)	砂土、赤黄色土壌を除く全土壌		6～8 kg/10a	
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田	水田一年生雑草 マツバイ	4～7月の雑草発生前～発生始期	全土壌	4～6 kg/10a	1回	全面土壌均一散布又は土壌混和处理	
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) スギナ	秋冬期～春期の雑草発生前～発生始期				全面土壌散布	
樹木等	公園庭園 塚とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面 鉄道 等	一年生雑草	雑草発生前～発生始期	—	6～9 kg/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	3回以内
		多年生広葉雑草 スギナ			10～15 kg/10a			

