

土壤消毒剤  
バスアミド微粒剤  
ダゾメット粉粒剤

平成30年8月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「非結球メキャベツ」を追加する。
- 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く)」を「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)」へ変更し、作物名「未成熟そらまめ」を使用時期「は種21日前又は定植45日前まで」として追加する。
- 作物名「未成熟そらまめ」に適用病害虫名「えそモザイク病」を追加する。
- 作物名「しそ」の使用時期「は種14日前まで」を「は種14日前又は定植21日前まで」へ変更する。
- 作物名「ほうれんそう」の使用時期「は種10日前まで(地温20℃以上)」に適用病害虫名「ホウレンソウケナガコナダニ」を追加し、使用時期を「は種10日前まで」に変更する。
- 作物名「にんじん」に適用病害虫名「乾腐病」を追加する。
- 作物名「きゅうり」「メロン」「すいか」「トマト」「ミニトマト」「なす」「ピーマン」「たまねぎ」「にんにく」「こら」「にんじん」「レタス」「非結球レタス」「食用ぎく」「ふき」「さやいんげん」「えだまめ」「かんしょ」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- 作物名「あしたば」「みつば」「つるむらさき」「モロヘイヤ」に適用病害虫名「一年生雑草」を追加する。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数		
<b>非結球メキャベツ</b>	萎黄病、一年生雑草	20～30kg/10a	定植 21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1 回		
きゅうり	苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～400g/m <sup>2</sup>	は種又は定植 21 日前まで		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。			
	メロン	つる割病、半身萎凋病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草			20～30kg/10a		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
すいか		黒点根腐病、つる割病、半身萎凋病、 黒変根腐症、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草			20～30kg/10a		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
	トマト ミニトマト	紅色根腐病			30kg/10a		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
なす		苗立枯病(リゾクトニア菌)			200～400g/m <sup>2</sup>		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	ピーマン	つる割病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草			20～30kg/10a		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
たまねぎ		苗立枯病(リゾクトニア菌)			200～300g/m <sup>2</sup>		秋期(翌春は種) は種又は定植 21 日前まで	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。
	萎凋病、褐色根腐病、 <b>白絹病</b> 、根腐萎凋病、 半身萎凋病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a						
	紅色根腐病	30kg/10a						
	青枯病	30～60kg/10a						
	黒腐菌核病	30～60kg/10a						
にんにく	乾腐病、 <b>白絹病</b> 、ネコブセンチュウ	20～30kg/10a			は種 14 日前まで		本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。	
	苗立枯病	20～40kg/10a						
	黒穂病、一年生雑草	20～30kg/10a						
にら	イモグサレセンチュウ、 <b>白絹病</b> 紅色根腐病、一年生雑草	30kg/10a			植付 28 日前まで		1 回	1 回
にんじん	乾腐病、紅色根腐病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草	20～30kg/10a			は種又は定植 21 日前まで			
あしたば	萎凋病、根腐病、しみ腐病、 <b>乾腐病</b> 、 <b>白絹病</b> ネコブセンチュウ、一年生雑草				は種 10 日前まで			
レタス	苗立枯病(リゾクトニア菌)、 <b>一年生雑草</b>	30kg/10a			は種又は定植 14 日前まで			
非結球レタス	すそ枯病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草	20～30kg/10a			は種又は定植 21 日前まで			
食用ぎく	すそ枯病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草	20～30kg/10a			は種又は定植 21 日前まで			
ふき	センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) 萎凋病、半身萎凋病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草	30kg/10a			は種又は定植 21 日前まで			
みつば	青枯病							
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、ええんどう、 う、ぎやえんどう、ぎ やいんげん、未成熟 そらまめを除く)	半身萎凋病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草	20kg/10a		は種 21 日前まで				
さやいんげん	立枯病、 <b>一年生雑草</b>	20～30kg/10a	は種又は定植 21 日前まで					
えだまめ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病、 <b>白絹病</b> 、一年生雑草							
<b>未成熟そらまめ</b>	ダイズシストセンチュウ	30kg/10a	は種 21 日前又は 定植 45 日前まで					
かんしょ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病、 <b>えそモザイク病</b> 、一年生雑草	20～30kg/10a	植付 21 日前まで					
ほうれんそう	紫紋羽病、つる割病、 <b>白絹病</b> ネコブセンチュウ、一年生雑草							
つるむらさき	ハウレンソウケナガコナダニ、立枯病、 萎凋病、株腐病、根腐病、一年生雑草	30kg/10a	は種 10 日前まで					
しそ	ネコブセンチュウ、 <b>一年生雑草</b>		定植 21 日前まで					
モロヘイヤ	青枯病、一年生雑草	30kg/10a	は種 14 日前又は 定植 21 日前まで					
	ネコブセンチュウ、 <b>一年生雑草</b>		定植 30 日前まで					

