

土壤消毒剤
バスアミド微粒剤
ダゾメット粉粒剤

平成30年8月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「非結球メキャベツ」を追加する。
- 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く)」を「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)」へ変更し、作物名「未成熟そらまめ」を使用時期「は種21日前又は定植45日前まで」として追加する。
- 作物名「未成熟そらまめ」に適用病害虫名「えそモザイク病」を追加する。
- 作物名「しそ」の使用時期「は種14日前まで」を「は種14日前又は定植21日前まで」へ変更する。
- 作物名「ほうれんそう」の使用時期「は種10日前まで(地温20℃以上)」に適用病害虫名「ホウレンソウケナガコナダニ」を追加し、使用時期を「は種10日前まで」に変更する。
- 作物名「にんじん」に適用病害虫名「乾腐病」を追加する。
- 作物名「きゅうり」「メロン」「すいか」「トマト」「ミニトマト」「なす」「ピーマン」「たまねぎ」「にんにく」「こら」「にんじん」「レタス」「非結球レタス」「食用ぎく」「ふき」「さやいんげん」「えだまめ」「かんしょ」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- 作物名「あしたば」「みつば」「つるむらさき」「モロヘイヤ」に適用病害虫名「一年生雑草」を追加する。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数	
非結球メキャベツ	萎黄病、一年生雑草	20～30kg/10a	定植 21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1 回	
きゅうり	苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～400g/m ²	は種又は定植 21 日前まで		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。		
	つる割病、半身萎凋病、 白絹病 、一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。		
メロン	黒点根腐病、つる割病、半身萎凋病、 黒変根腐症、 白絹病 、一年生雑草						30kg/10a
	紅色根腐病	200～400g/m ²					
すいか	苗立枯病(リゾクトニア菌)				20～30kg/10a		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。
	つる割病、 白絹病 、一年生雑草	200～300g/m ²					
トマト ミニトマト	苗立枯病(リゾクトニア菌)				20～30kg/10a		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。
	萎凋病、褐色根腐病、 白絹病 、根腐萎凋病、 半身萎凋病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	30kg/10a					
	紅色根腐病						
なす	青枯病	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。		
	苗立枯病(リゾクトニア菌)、半身萎凋病、 ネコブセンチュウ、 白絹病 、一年生雑草						30kg/10a
ピーマン	苗立枯病(リゾクトニア菌)、半身萎凋病、 萎凋病、青枯病、 白絹病 、一年生雑草	30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。		
たまねぎ	黒腐菌核病	30～60kg/10a			秋期(翌春は種) は種又は定植 21 日前まで		
	紅色根腐病	30kg/10a					
	乾腐病、 白絹病 、ネコブセンチュウ	20～30kg/10a					
	苗立枯病	20～40kg/10a					
	黒穂病、一年生雑草	20～30kg/10a					
	一年生雑草	10～20kg/10a			は種 14 日前まで		本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。
にんにく	イモグサレセンチュウ、 白絹病 紅色根腐病、一年生雑草	30kg/10a			植付 28 日前まで		
にら	乾腐病、紅色根腐病、 白絹病 、一年生雑草	20～30kg/10a			は種又は定植 21 日前まで		
にんじん	萎凋病、根腐病、しみ腐病、 乾腐病 、 白絹病 ネコブセンチュウ、一年生雑草				は種 10 日前まで		
あしたば	苗立枯病(リゾクトニア菌)、 一年生雑草	30kg/10a			は種又は定植 14 日前まで		
レタス	すそ枯病、 白絹病 、一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植 21 日前まで			
	ネグサレセンチュウ	30kg/10a					
非結球レタス	すそ枯病、根腐病、 白絹病 、一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植 21 日前まで				
食用ぎく	センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) 萎凋病、半身萎凋病、 白絹病 、一年生雑草			30kg/10a			
	青枯病	20kg/10a					
ふき	半身萎凋病、 白絹病 、一年生雑草		30kg/10a				
みつば	立枯病、 一年生雑草	30kg/10a					
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、ええんどう、 う、ぎやえんどう、 やいづんげん、未成熟 そらまめを除く)	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病、一年生雑草		20～30kg/10a	は種 21 日前又は 定植 45 日前まで			
	さやいんげん	苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病、 白絹病 、一年生雑草					
えだまめ	ダイズシストセンチュウ	30kg/10a	は種 21 日前又は 定植 45 日前まで				
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病、 えそモザイク病 、一年生雑草						
かんしょ	紫紋羽病、つる割病、 白絹病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a	植付 21 日前まで				
ほうれんそう	ハウレンソウケナガコナダニ、立枯病、 萎凋病、株腐病、根腐病、一年生雑草	20～30kg/10a	は種 10 日前まで				
つるむらさき	ネコブセンチュウ、 一年生雑草		定植 21 日前まで				
しそ	青枯病、一年生雑草	30kg/10a	は種 14 日前又は 定植 21 日前まで				
モロヘイヤ	ネコブセンチュウ、 一年生雑草		定植 30 日前まで				

