

除草剤
キレダー
ACN水和剤

令和元年 6月12日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「樹木等」に適用雑草名「イシクラゲ」を追加。
- 作物名「樹木等」の適用雑草名「ゼニゴケ」を「コケ類」に変更。
- 作物名「樹木等」の使用方法を「植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布」に変更。
- 作物名「つつじ類(鉢植え)」の使用方法を「散布」を「雑草茎葉散布」に変更。
- 作物名「日本芝(こうらいしば)」「西洋芝(ベントグラス)」の使用方法を「散布(噴霧器)」を「散布」に変更。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	ACNを含む農薬の総使用回数
つつじ類(鉢植え)	ゼニゴケ	ゼニゴケ生育期	500倍	鉢内土壌表面積 1㎡当り 1ℓ	—	<u>雑草茎葉散布</u>	—

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ACNを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝(こうらいしば)	—	藻類 コケ類	藻類・コケ類の発生時	3~4kg/10a (3~4g/㎡)	200~300ℓ/10a	3回以内	<u>散布</u>	3回以内
西洋芝(ベントグラス)		コケ類	冬期芝生育期(コケ類の発生時)	2~4kg/10a (2~4g/㎡)				
樹木等	公園 庭園 宅地	イシクラゲ	イシクラゲ生育期	2~4g/㎡	200ml/㎡	3回以内	<u>植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布</u>	3回以内
	駐車場 運動場 道路等	<u>コケ類</u>	コケ類生育期	2g/㎡	100~1000ml/㎡			

<使用上の注意事項の変更>

【追加】

(2)イシクラゲに使用する場合、雨上がりなどイシクラゲが水を含んで膨潤な時に使用すること。

【変更前】

(4)植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等にかからないように散布すること。

(7)公園、庭園等で使用する場合、特に以下のことに注意すること。

③水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意すること。

【変更後】

(1)本剤の所要量を所定量の水に加えてよく攪拌し、じょうろ又は噴霧器でコケ類、藻類に十分かかるように散布すること。

(2)イシクラゲに使用する場合、雨上がりなどイシクラゲが水を含んで膨潤な時に使用すること。

(3)さつき、つつじにかかる場合があるので、直接かからないように注意して散布すること。

(4)植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木類等にかからないように散布すること。

(5)使用後のじょうろや噴霧器は十分水で洗っておくこと。

(6)調製した散布液はなるべく早く使用すること。

(7)公園、庭園等で使用する場合、特に以下のことに注意すること。

①激しい降雨の予想される場合は使用をさけること。

②本剤の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害が生じることを十分注意して散布すること。

③水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意すること。

④散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。

(8)本剤は西洋芝に対して薬害を生じるおそれがあるので、高温時に使用しないこと。

(9)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。

(10)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。